

Karta Pacjenta

Aboxoma (Apixabanum)



Należy zawsze mieć tę kartę przy sobie/Dziecko lub jego opiekun powinni mieć tę kartę zawsze przy sobie.
Przed leczeniem należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego.



XXXXX

XXXXX

Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Aboxoma (Apixabanum) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

Informacja dla pacjentów/ opiekunów



♦ Lek Aboxoma należy przyjmować/podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia dawki porannej, należy przyjąć/podać tabletkę od razu, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni i można ją przyjąć/podać jednocześnie z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać wyłącznie tego

samego wieczoru. Nie należy przyjmować/podawać dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy kontynuować przyjmowanie/podawanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.

- ♦ Nie należy przerywać przyjmowania/podawania leku Aboxoma bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu (dorośli)/zakrzepu krwi (pacjenci pediatryczni) lub innych powikłań.
- ♦ Aboxoma pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.

- ♦ Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień w tym zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, błądź lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.

- ♦ Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**

- ♦ W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakimkolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aboxoma.

01/2026

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- ♦ Aboxoma (Apixabanum) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- ♦ Aboxoma może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- ♦ Leczenie lekiem Aboxoma nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg

chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) – patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

- ♦ Dla osób dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowany przeciw czynnikowi Xa, jednakże nie ustalono jego bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (patrz Charakterystyki Produktów Leczniczych dla andeksanetu alfa).

Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Masa ciała (pacjenci pediatryczni):

Dawka: _____ mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:
